




# TIPOS DE PRUEBAS COVID-19

 SPA	PCR	Test serológico	Test rápido serológico	Test rápido de antígeno
<b>Cómo se realiza</b>	Muestra exudado nasofaríngeo.	Extracción de sangre venosa y envío al laboratorio para análisis de muestras.	Punción en dedo.	Muestra exudado nasofaríngeo.
<b>Qué detecta</b>	ARN del virus.	IGG e IGM.	IGG IGM / ab.	Proteína del virus.
<b>Rapidez resultados</b>	Resultados en 24-48 horas (según situación pandemia).	Resultados 24-48 horas.	Resultados 15 minutos.	Resultados 15 minutos.
<b>Qué indica si positivo</b>	Infección aguda, resuelta o pasada, depende de los síntomas y de IGG.	<b>IGM+:</b> infección activa o pasada.(depende de síntomas y de IGG). <b>IGG+:</b> infección pasada.	<b>IGM+:</b> infección activa o pasada (depende de síntomas de IGG) realizar PDIA. <b>IGG+:</b> infección pasada.	Infección aguda.
<b>Qué indica si negativo</b>	No infección activa. Depende de IGM para valoración completa y conocer estado inmunitario.	Si hay síntomas debe realizarse PCR. No descarta infección.	Si hay síntomas debe realizarse PCR. No descarta infección.	No infección activa.
<b>Necesita prescripción médica</b>	Sí.	Sí.	Sí.	Sí.
<b>Ventajas</b>	Elevada sensibilidad y especificidad.	Mayor sensibilidad y especificidad que los test rápidos.	Rápido y barato. Posibilidad de realización en el lugar de la toma.	Rápido, elevada sensibilidad en sintomáticos y especificidad, coste bajo, autorizados estudios de cribado. Confirma diagnóstico si síntomas < o igual a 5 días y en cribados en entornos con alta prevalencia.
<b>Inconvenientes</b>	Precio elevado. Realización por personal especializado. Tardanza de resultados.	Mayor sensibilidad que los test rápidos. Sólo se deben realizar en sintomáticos de más de 7 días de evolución por que daría falso negativo. Test negativo en sintomáticos indicación de PCR ya que no descarta infección.	Baja sensibilidad y especificidad de los test dando falsos negativos y falsos positivos. Sólo se deben realizar en sintomáticos de más de 7 días de evolución por que daría falso negativo. Test negativo en sintomáticos indicación de PCR ya que no descarta infección no indicado en estudios de cribado.	Realización por personal especializado. Eliminación de residuos.



**COBERTURA A NIVEL NACIONAL**



**NOS DESPLAZAMOS A SU EMPRESA\***



**PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE A SU COMERCIAL**

\* En función del número de pruebas podemos desplazarnos para realizarlas en su empresa. Consulte disponibilidad con su comercial.